



ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

VITREOLENT (3 mg +3 mg)/ml krople do oczu, roztwór
(*Kalii iodidum + natrii iodidum*)

SPRAWDZONO
POD WZGLĘDEM
MERYTORYCZNYM

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

- Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
- Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.
- Lek ten został przepisany ściśle określonej osobie i nie należy go przekazywać innym, gdyż może im zaszkodzić, nawet jeśli objawy ich choroby są takie same.
- Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiegokolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

Spis treści ulotki:

1. Co to jest Vitreolent – krople do oczu i w jakim celu się go stosuje.
2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Vitreolent.
3. Jak stosować lek Vitreolent.
4. Możliwe działania niepożądane.
5. Jak przechowywać lek Vitreolent.
6. Inne konieczne informacje dotyczące leku Vitreolent.

1. CO TO JEST PREPARAT VITREOLENT I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE.

Preparat Vitreolent – krople do oczu jest lekiem stosowanym w przypadku zmętnień ciała szklistego i zmian po wylewach krwi do ciała szklistego, których przyczyną może być: wiek, nadciśnienie, cukrzyca, krótkowzroczność, zmiany okołonaczyniowe. Stosowany jest również w zmętnieniach soczewki będących pierwszymi objawami zaćmy.

2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU VITREOLENT.

Kiedy nie należy stosować leku Vitreolent

- Jeśli u pacjenta stwierdzono nieprawidłową czynność tarczycy
- Jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na substancje czynne lub którykolwiek z pozostałych składników leku Vitreolent

W przypadku używania przez pacjenta soczewek kontaktowych mogą być one ponownie założone 15 minut po wkropleniu preparatu. Nie należy zakraplać preparatu do oka z założoną soczewką kontaktową.

Stosowanie leku Vitreolent z innymi lekami

Należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, nawet tych, które są wydawane bez recepty.

Nie należy także stosować leku Vitreolent jednocześnie z innymi lekami stosowanymi do oczu. W przypadku konieczności stosowania innych leków do oczu Vitreolent należy wkraplać zachowując przerwę co najmniej 5 minut od podania innego leku.

Ciąża i karmienie piersią

Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

MINISTERSTWO ZDROWIA
Departament Polityki Lekowej i Farmacji
00-952 Warszawa
ul. Młodsza 15

Podanie leku Vitreolent może powodować po wkropleniu przemijające zaburzenie widzenia w postaci zamglenia. W tym czasie nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać urządzeń mechanicznych.

3. JAK STOSOWAĆ LEK VITREOLENT

Lek Vitreolent przeznaczony jest wyłącznie do podawania do oczu.

Lek Vitreolent należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W przypadku wątpliwości należy ponownie skontaktować się z lekarzem. Zazwyczaj stosowana dawka leku to 1 kropla do oka wykazującego zmiany chorobowe od 1 do 3 razy na dobę.

Stosowanie leku Vitreolent u dzieci

Nie zaleca się stosowania leku u dzieci poniżej 12 lat

Sposób użycia

Przed zakraplaniem leku należy umyć ręce. Następnie odkręcić nakrętkę, ująć butelkę palcem wskazującym i kciukiem. Palcem wskazującym drugiej ręki należy odchylić lekko dolną powiekę. Kroplę wkraplać do worka spojówkowego lekko ściskając butelkę. Nie należy dotykać oka końcówką zakraplacza. Po zakropleniu należy zamknąć oko i przez 1 do 2 minut delikatnie ucisnąć palcem przynosowy kącik oka w celu ograniczenia ogólnoustrojowego wchłaniania preparatu. Dokładnie zamknąć butelkę.

W razie wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek Vitreolent może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Działania niepożądane występujące często (częściej niż u 1 na 100, ale rzadziej niż u 1 na 10 pacjentów):

- przemijające uczucie pieczenia i „piasku” pod powiekami przez krótką chwilę po wkropleniu preparatu, powiększenie tarczycy lub zmiany o charakterze trądziku.

Działania niepożądane występujące rzadko (częściej niż u 1 na 10 000, ale rzadziej niż u 1 na 1 000 pacjentów):

- wzmożone łzawienie

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiegokolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy poinformować o nich lekarza lub farmaceutę.

5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK VITREOLENT

Lek należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie należy stosować leku Vitreolent po upływie terminu ważności umieszczonego na opakowaniu.

Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Lek należy przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Po pierwszym otwarciu leku może on być używany przez okres nie dłuższy niż 4 tygodnie.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, co zrobić z lekami, których się już nie potrzebuje. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. INNE KONIECZNE INFORMACJE DOTYCZĄCE LEKU VITREOLENT

Co zawiera lek Vitreolent

- Substancja czynna jest jodek sodu i jodek potasu. 1 ml preparatu zawiera jodek sodu 3 mg, jodek potasu 3 mg.
- Substancje pomocnicze:
krople do oczu w postaci roztworu zawierają: dioctan chloroheksydyny 0,1 mg/ml, sorbitol, α -tokoferolu, hypromelozę, kwas solny 1M, wodę do wstrzykiwań

Jak wygląda lek Vitreolent i co zawiera opakowanie

Vitreolent to roztwór do podania do oka (krople do oczu) w butelce LDPE zakraplaczem, zakrętką HDPE i pierścieniem zabezpieczającym w tekturowym pudełku.
Butelka zawiera 10 ml leku.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny

Pharm Supply Sp. z o.o., ul. Marconich 2/9, 02-954 Warszawa

Wytwórca

Excelevison, rue de la Lombardiere, 07100 Annonay, Cedex, Francja

Data opracowania ulotki :

2008 -12- 03

MINISTERSTWO ZDROWIA
Departament Polityki Lekowej i Farmacji
00-952 Warszawa
ul. Miodowa 15